

Kdy jsem indikován k aplikaci monoklonálních protilátek REGN-COV2?

- pozitivní výsledek testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR)
- dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg
- do 10 dnů od nástupu příznaků covid-19
- klinický stav nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19
- klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19
- dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá
- je vysoké riziko progresu do závažné formy infekce:
 - věk ≥ 65 let
 - věk ≥ 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: - kardiovaskulární onemocnění, - hypertenze, - chronické respirační onemocnění, obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m²
 - obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 kg/m²
 - diabetes mellitus
 - chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 - chronické onemocnění jater
 - primární nebo sekundární imunodeficit
 - imunosupresivní léčba
 - chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
 - onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 - trombofilní stav v dispenzární péči
 - neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 - stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 - věk 12 –17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: - BMI ≥ 85 . percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, - srpkovitá anémie, - vrozené nebo získané onemocnění srdce, - neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna, - zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo

přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním COVID-19), - astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující denní podání léků

- jiné individuální rizikové faktory progresu COVID-19 dle posouzení lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika

PRŮBĚH APLIKACE:

1. Vstupní pohovor s lékařem

Pacient lékaře informuje o důvodu podání monoklonálních protilátek - vhodné je doporučení od praktického lékaře. Pokud pacient splní indikační kritéria k podání, je poučen o informacích souvisejících s přípravkem a jeho podáním.

2. Infuzní podání léku

Trvá cca 30 minut, objem infuze je 110 ml.

3. Sledování po podání infuze

Pacient zůstává v infuzním centru ještě cca dalších 60 min kvůli pozorování.